



LA PIROPLASMOSE

La piroplasmose (ou babésiose) est une maladie infectieuse, non contagieuse, causée par des protozoaires appelé piroplasmes qui détruisent les globules rouges.

Cette maladie touche les petits et grands ruminants domestiques, les canidés, les cervidés, et l'homme s'ils sont piqués par la tique porteuse de l'agent pathogène.

Elle est transmise par les tiques, acariens géants, d'espèces Ixodes.

COMMENT SE PROPAGE LA MALADIE ?

La maladie se propage uniquement suite à la morsure par une tique infectée. La piroplasmose est une maladie saisonnière (printemps et automne), liée à l'activité de tiques infectées sur des parcelles souvent bordées de bois ou parsemées de buissons.

LES SYMPTÔMES

Les symptômes de la piroplasmose sont :

- Urines rouges voire noires,
- Fièvre importante supérieure à 40°C associée à des douleurs
- Arrêt de la rumination

COMMENT TRAITER ?

Dès les premiers symptômes, l'appel au vétérinaire est urgent. Le traitement visera à arrêter la multiplication du parasite, à corriger l'anémie (transfusion) et à refaire marcher les reins.

EN BREF :

- **ATTENTION AUX ANIMAUX MIS SUR DES PARCELLES « À RISQUE »**
- **EN CAS DE SUSPICION : PRÉVENEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE**

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : CONTACTEZ NOUS